

PROTOCOLO DE MANEJO DE HISOPADOS RECTALES PARA CONTROLAR LA DISEMINACIÓN DE GÉRMENES MULTIRRESISTENTES (KPC/EVR)

Comité de Control de Infecciones

MARZO 2019

Manejo de hisopados rectales para controlar la diseminación de gérmenes multirresistentes (KPC/EVR)

Centro Municipal de Salud de Tres Arroyos
Comité de Control de Infecciones

Indicaciones de hisopados rectales en UCI

- Realizar hisopados rectales de vigilancia para KPC/EVR todos los días martes en UCI a todos los pacientes, sin importar el día del ingreso.
- Realizar hisopados rectales para KPC/EVR a todos los pacientes al alta de UCI (a excepción del martes que se hará el del día correspondiente).
- Aislar de contacto en habitación individual al ingreso a todo paciente que provenga de otra institución (tanto sala, como áreas críticas), hasta tener dos hisopados rectales negativos, los cuales serán tomados con 24 horas de diferencia. Esto se llevara a cabo en cualquier sitio de internación inclusive la guardia.
- Aislar de contacto en habitación individual al ingreso a todo paciente que haya estado internado en otra institución en los últimos seis meses hasta tener dos hisopados rectales negativos, los cuales serán tomados con 24 horas de diferencia. Esto se llevara a cabo en cualquier sitio de internación inclusive la guardia.
- Los pacientes que sean derivados de áreas de menor complejidad de nuestro mismo centro no requerirán hisopados de ingreso a UTI

Indicaciones de hisopados rectales en sala general

- Paciente que permanece menos de una semana en UCI y que pasa a la sala requerirá un sólo hisopado para descartar colonización por KPC/EVR.
- Los pacientes que presenten más de una semana de internación van a requerir dos hisopados para descartar KPC/EVR.
- Todo paciente que sea derivado desde UTI, ingresará a la sala en aislamiento de contacto (de ser necesario en habitación compartida) al menos 48 hs hasta recibir el resultado del hisopado de salida, lo cual será comunicado a UCI.
- Los pacientes internados en sala que requerirán ser derivados a UTI no se les realizará hisopados rectales. Los resultados de hisopado rectal de vigilancia y de salida serán enviados a UCI.
- Todos los pacientes que ingresen derivados de Hospitales de mayor complejidad(Bahía Blanca, Buenos Aires, Gran Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Azul, Tandil, etc.) o que hayan estado internados en dichos Hospitales en los últimos 6 meses, deberán ingresar en aislamiento de contacto estricto hasta recibir 2 resultados de hisopado rectal (-)

Tres Arroyos, Marzo 2019